

Using Naloxone during an Opioid Overdose



1 Assess and Call 911



- Attempt to wake up the individual by yelling their name or using your knuckle to rub their sternum
- Check the individual's breathing
- Call 911 immediately



Naloxone will only work to reverse an opioid overdose, no other substances

If suspected xylazine ingestion, do not delay calling 911 and giving naloxone

2 Administer Naloxone



- Peel back packaging and remove device
- Hold device with thumb on the plunger and 2 fingers on the nozzle
- Place and hold tip of the nozzle in either nostril until you touch the nose
- Press the plunger firmly to release dose into the individual's nose ***DO NOT TEST SPRAY***
- Repeat with second dose if no response after 2-3 minutes

3 Check Breathing



- If the individual isn't breathing, do rescue breaths if trained and comfortable
- Check to see if airway is clear
- Tilt person's head back, pinch nose closed, and open mouth
- Place your mouth over persons to make a seal and give 2 slow breaths
- Follow up with one breath every 5 seconds until person can breathe on their own

4 Stay and Assist



- Stay with the individual and monitor them
- Observe for withdrawal symptoms
- Place the individual on their side in the recovery position
- Naloxone wears off in 30 to 90 minutes
- Explain what happened to the first responders

Learn more at mattersnetwork.org



Uso de naloxona durante una sobredosis de opioides



1 Evalúe y llame al 911



- Despierte a la persona gritando su nombre o frotándole el esternón con los nudillos
- Verifique que la persona respira
- Llame al 911 de inmediato



La naloxona solo revierte sobredosis de opioides, no otra sustancia

Ante posible xilazina, llame al 911 y administre naloxona

2 Administrar naloxona



- Retire el empaque y saque el dispositivo.
- Sujete con el pulgar en el émbolo y dos dedos en la boquilla.
- Coloque y mantenga la punta de la boquilla en una fosa nasal hasta tocar el fondo de la nariz.
- Presione firmemente el émbolo para liberar la dosis individual. ***NO LO PRUEBE ANTES DE USAR***
- Repita con una segunda dosis si la persona no responde luego de 2-3 minutos

3 Verifique la respiración



- Si la persona no respira, inicie la respiración artificial o RCP (si está capacitado y se siente cómodo)
- Verifique que la vía respiratoria esté despejada
- Incline la cabeza de la persona hacia atrás, cierre la nariz con los dedos y abra su boca
- Coloque su boca sobre la de la persona para sellarla y dé dos respiraciones lentas.
- Continúe con una respiración cada cinco segundos hasta que la persona pueda respirar por sí misma

4 Quédese y Colabore



- Quédese con la persona y monitoréela
- Esté atento a los síntomas de abstinencia
- Coloque a la persona de lado en posición de recuperación
- El efecto de la naloxona desaparece en 30-90 minutos
- Informe a los primeros en responder sobre lo que ocurrió

Aprenda más en mattersnetwork.org

